

# Efectividad y seguridad de nivolumab con quimioterapia en cáncer gastroesofágico avanzado

Reyes de la Mata, Y., Cano Martínez, G., Martínez Díaz, C., Vazquez Vela, V., Frias Ruiz, P.

Nº8

Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz.

## Objetivo

Evaluar la efectividad y seguridad de nivolumab + quimioterapia (NQ) pacientes con adenocarcinoma gástrico (AG), esofágico (AE) o de la unión gastroesofágica (UGE) avanzado/metastásico, HER2 negativo y PD-L1 CPS  $\geq 5$ , comparado con el ensayo clínico (EC) CheckMate 649.


## Material y métodos

Observacional retrospectivo: pacientes con NQ con AG, AE o UGE avanzado/metastásico, HER2 negativo y CPS  $\geq 5$ . N=9 pacientes (entre 01/23-01/25). Mediana de edad de 66,5 años, 88,9% hombres, ECOG 0 en 66,6% de casos. Distribución: 55,5% AG, 22,2% AE y 22,2% UGE.

El EC incluyó 473 pacientes en el brazo NQ con CPS  $\geq 5$ , mediana de edad 63 años, 70% hombres. ECOG 0 en 41% y 1 en 59%. Distribución: 70% AG, 18% UGE, 12% AE.

## Resultados


SG estudio real	SG CheckMate 649	SLP estudio real	SLP CheckMate 649
8.57	14.4	11	7.7
meses (IC95% N/A-31,8)	meses (IC95% 13,1-16,2)	meses (IC95% 6,33-15,66)	meses (IC95% 7,0-9,2)



La neuropatía fue notablemente más frecuente en el estudio real (77,7% vs 24%), mientras que otras reacciones como náuseas, diarrea y vómitos presentaron frecuencias comparables.

### Supervivencia Global

Menor mediana en estudio real (8,57 vs 14,4 meses).



### Supervivencia libre de progresión

Mayor mediana en estudio real (11 vs 7,7 meses).



### Perfil de Seguridad

Reacciones adversas similares con variaciones en frecuencia.



## Conclusión

Los resultados del mundo real muestran diferencias en supervivencia comparado con el ensayo clínico CheckMate 649, con menor SG pero mayor SLP. El perfil de seguridad es comparable, aunque con frecuencias distintas de reacciones adversas, destacando mayor incidencia de neuropatía en práctica clínica habitual.